

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER**Anusol 10 mg/280 mg Zäpfchen**

Lidocainhydrochlorid 10 mg
Zinkoxid 280 mg

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Anusol jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 14 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Anusol und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen sie vor der Anwendung von Anusol beachten?
3. Wie ist Anusol anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Anusol aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST ANUSOL UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?Rektale Anwendung

Anusol gehört zur Gruppe der Arzneimittel gegen Hämorrhoiden und enthält zwei Wirkstoffe: Lidocain und Zinkoxid.

Symptomatische Behandlung ano-rektaler Erkrankungen wie: Hämorrhoiden, Risse und Juckreiz.

Wie immer bei Hämorrhoiden sollen Maßnahmen wie Hygiene, Verhindern von Verstopfung und, in einigen Fällen, eine Verödung der Hämorrhoiden bis zu einer Operation erwogen werden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ANUSOL BEACHTEN?**Anusol darf nicht angewendet werden,**

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Lidocain, Zinkoxid oder einen der sonstigen Bestandteile von Anusol sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Anusol ist erforderlich,

- Anusol für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Bei der Behandlung von Hämorrhoiden muss unbedingt auf eine gute Hygiene geachtet und Verstopfungen vermieden werden.
- Wenn nach 2 Wochen keine Besserung eintritt, müssen Sie Ihren Arzt aufsuchen.
- Wenn eine Reizung auftritt, wird empfohlen, die Behandlung mit Anusol abzusetzen.

Bei Einnahme von Anusol mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Anusol ist zur rektalen Anwendung bestimmt. Das Produkt sollte auf jeden Fall während der Schwangerschaft und Stillzeit mit Vorsicht angewendet werden.

Planen Sie eine Schwangerschaft, sind Sie schwanger oder stillen Sie Ihr Kind? Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

3. WIE IST ANUSOL ANZUWENDEN?

Wenden Sie Anusol immer genau nach Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Anwendung bei Erwachsenen

Anusol Zäpfchen müssen in den After eingeführt werden.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis ein Zäpfchen am Morgen, ein Zäpfchen am Abend sowie ein Zäpfchen nach jedem Stuhlgang. Nicht mehr als 6 Zäpfchen pro 24 Stunden anwenden.

Anwendung bei Kindern

Anusol wird bei Kindern nicht empfohlen.

Wenn Sie eine größere Menge von Anusol angewendet haben, als Sie sollten

Eine längere hochdosierte Anwendung kann zu Symptomen einer Lidocain-Überdosierung führen. Die Behandlung muss dann sofort abgebrochen werden.

Wenn Sie eine größere Menge von Anusol haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antgiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie die Anwendung von Anusol vergessen haben

Wenn Sie eine Dosis vergessen haben, wenden Sie die nächste zum vorgesehenen Zeitpunkt an. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Anusol Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Überempfindlichkeitsreaktionen sind selten. Bei besonders empfindlichen Patienten kann eine lokale Reizung auftreten.

Die Nebenwirkungen des Lidocains sind allgemeiner Art (durch übermäßige Resorption, die in diesem Fall aufgrund der niedrigen Konzentration nicht zu erwarten ist) z. B. Nervosität, Schwindel, Zittern, Schläfrigkeit, niedriger Blutdruck und langsamerer Herzschlag.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST ANUSOL AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht über 30°C lagern.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Anusol enthält

- Die Wirkstoffe sind Lidocainhydrochlorid und Zinkoxid. Jedes Zäpfchen enthält 10 mg Lidocainhydrochlorid und 280 mg Zinkoxid.
- Die sonstigen Bestandteile sind feste halbsynthetische Glyceride.

Wie Anusol aussieht und Inhalt der Packung

Anusol Zäpfchen sind weiße Zäpfchen in einer PVC/PE Blisterpackung. Kartondose mit 18 Zäpfchen.

Abgabe

Apothekenpflichtig.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Johnson & Johnson Consumer NV/SA

Antwerpseweg 15-17

BE-2340 Beerse

Hersteller

Farnea
10, Rue Bouché Thomas
ZAC sud d'Orgemont
49007 Angers
Frankreich

Zulassungsnummer

BE 265185

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 03/2011